

6.2.2 完全性の証明

1/13

定理6.7: EVAL-IN-Eは $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -完全

証明: 例5.6より, $\text{EVAL-IN-E} \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$, よって,
 $\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} [L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}]$

を示せばよい.

L : 任意の $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ 集合とする.

L を $2^{p(l)}$ 時間で認識するプログラムが存在($p(l)$ は多項式)

そのプログラムを A_L とする. このとき,

$x \in L \leftrightarrow A_L(x) = \text{accept}$

$\text{time}_{A_L}(x) \leq 2^{p(|x|)}$

L から EVAL-IN-E への還元として次の関数 h を考える.

$h(x) \equiv \langle A_L^1, x, \overline{p(|x|)} \rangle$ for $\forall x \in \Sigma^*$

すると, h は全域的で, 多項式時間計算可能.

6.2.2 Proof of Completeness

1/13

Theorem 6.7: EVAL-IN-E is $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -completeness.

Proof: By Example 5.6, we have $\text{EVAL-IN-E} \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$. Thus, it suffices to prove

$\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} [L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}]$

L : any $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ set.

There is a program recognizing L in time $2^{p(l)}$ ($p(l)$ is polynomial)

Let the program be A_L . Then, we have

$x \in L \leftrightarrow A_L(x) = \text{accept}$

$\text{time}_{A_L}(x) \leq 2^{p(|x|)}$

Consider the following function h to reduce from L to EVAL-IN-E .

$h(x) \equiv \langle A_L^1, x, \overline{p(|x|)} \rangle$ for $\forall x \in \Sigma^*$

Then, h is total and computable in polynomial time.

また, すべての $x \in \Sigma^*$ に対し

$x \in L \leftrightarrow A_L(x) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \text{eval}(\overline{A_L}, x) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \text{eval_in_time}(\overline{A_L}, x, \overline{2^{p(|x|)}}) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \langle \overline{A_L}, x, \overline{2^{p(|x|)}} \rangle \in \text{EVAL-IN-E}$

$\leftrightarrow h(x) \in \text{EVAL-IN-E}$

ゆえに, h は L から EVAL-IN-E への多項式時間還元.

$\therefore L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}$ for $\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$

すなわち, EVAL-IN-E は $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -完全.

証明終

2/13

Moreover, for each $x \in \Sigma^*$ we have

$x \in L \leftrightarrow A_L(x) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \text{eval}(\overline{A_L}, x) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \text{eval_in_time}(\overline{A_L}, x, \overline{2^{p(|x|)}}) = \text{accept}$

$\leftrightarrow \langle \overline{A_L}, x, \overline{2^{p(|x|)}} \rangle \in \text{EVAL-IN-E}$

$\leftrightarrow h(x) \in \text{EVAL-IN-E}$

Thus, h is a polynomial-time reduction from L to EVAL-IN-E .

$\therefore L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}$ for $\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$

That is, EVAL-IN-E is $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -complete.

Q.E.D.

2/13

定理6.8.

- (1) $\text{EVAL-IN-E} \notin \mathcal{P}$
- (2) EVAL-IN-E は \mathcal{NP} -困難
- (3) HALT-IN-E は $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -完全.

証明:

(1) EVAL-IN-E は $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -完全集合で, $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -完全集合 $\notin \mathcal{P}$.

(2) $\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} [L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}]$ と

$\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ より.

3/13

Theorem 6.8.

- (1) $\text{EVAL-IN-E} \notin \mathcal{P}$
- (2) EVAL-IN-E is \mathcal{NP} -hard.
- (3) HALT-IN-E is $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -complete.

Proof:

(1) EVAL-IN-E is $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -complete and any $\mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$ -complete set $\notin \mathcal{P}$.

(2) It follows from

$\forall L \in \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P} [L \leq_m^p \text{EVAL-IN-E}]$ and

$\mathcal{NP} \subseteq \mathcal{E}\mathcal{X}\mathcal{P}$

3/13

4/13

6.2.2. 完全性の証明

(\mathcal{NP})完全性の証明方法
 (I) 定義通りにすべての L について示す
 (II) すでに完全であることがわかっている問題を利用する

(I)の例: 定理6.7, 定理6.9(≡Cookの定理(SATでTMを模倣))

3SATなどは、形式が一樣なので扱いやすい

基本的には...
 1. 多項式時間で動く標準プログラムを考えて
 2. プログラムの動作を命題論理式で模倣する
 →とても大変(手間がかかる)

(II)の例: 例6.4($3SAT \leq_m^p$ DHAM), 定理6.10, ...
 DHAMは一般のグラフ上で \mathcal{NP} 完全
 DHAMは平面グラフに限定しても \mathcal{NP} 完全
 DHAMは「頂点の次数=3」に限定しても \mathcal{NP} 完全
 DHAMは2部グラフに限定しても \mathcal{NP} 完全...

4/13

6.2.2. Proof for completeness

Two ways to prove (\mathcal{NP} -)completeness
 (I) show 'for all L ' according to definition
 (II) use some known complete problems

Ex for (I): Theorem 6.7,
 Theorem 6.9(≡Cook's Theorem; simulate TM by SAT)

Easy to manipulate since, e.g., 3SAT has a uniform structure.

Basically...
 1. For any program in standard form,
 2. simulate it by SAT formulae
 →pretty complicated and tedious

Ex for (II): Example 6.4($3SAT \leq_m^p$ DHAM), Theorem 6.10, ...
 DHAM is \mathcal{NP} -complete for general graphs
 DHAM is \mathcal{NP} -complete even for planar graphs
 DHAM is \mathcal{NP} -complete even for graphs with max degree=3
 DHAM is \mathcal{NP} -complete even for bipartite graphs ...

5/13

定理6.10: 以下にあげる集合はすべて \mathcal{NP} -完全
 (1) 3SAT, SAT (ExSATからの還元)
 (2) DHAM, VC (3SATからの還元)
 (3) KNAP, BIN (3SATからの還元と $KNAP \leq_m^p$ BIN)

(II) \mathcal{NP} 完全性がわかっている問題からの多項式時間還元:
 1. $3SAT \leq_m^p$ VC
 2. $DHAM \leq_m^p$ DHAM with vertices of degree ≤ 5

Vertex Cover: すべての辺の、少なくとも一方の頂点を含む集合
 Hamiltonian cycle: すべての頂点を一度ずつ通る閉路

おまけ: DHAMは次数高々3でも \mathcal{NP} 完全。
 高々2だと多項式時間で計算可能。

5/13

Theorem 6.10 The following sets are all \mathcal{NP} -complete:
 (1) 3SAT, SAT (reduction from ExSAT)
 (2) DHAM, VC (reduction from 3SAT)
 (3) KNAP, BIN (reduction from 3SAT and $KNAP \leq_m^p$ BIN)

(II) Polynomial time reductions from \mathcal{NP} -complete problems:
 1. $3SAT \leq_m^p$ VC
 2. $DHAM \leq_m^p$ DHAM with vertices of degree ≤ 5

Vertex Cover: a vertex set that contains at least one endpoint for each edge
 Hamiltonian cycle: a cycle that visits each vertex exactly once

Note : DHAM remains \mathcal{NP} -complete even if max degree 3. But it is polynomial time solvable if max degree 2.

6/13

定理6.10(2) : VC は \mathcal{NP} 完全問題

[証明] VC \in \mathcal{NP} なので、 $3SAT \leq_m^p$ VC であることを示せばよい。
 論理式 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ が与えられたとする。
 F から以下の条件を満たすグラフと自然数の組 $\langle G, k \rangle$ が多項式時間で構成できることを示す:

F を1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ

G の構成(F は n 変数 m 項とする):
 1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
 2. F の各項 $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ に対し、頂点 l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} と辺 $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$ を加える
 3. 項 C_j のリテラル l_{j1} が x_i のときは辺 (l_{j1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{j1}, x_i^-) を加える。
 4. $k = n + 2m$

6/13

Theorem 6.10(2) : VC is \mathcal{NP} -complete

[Proof] Since VC \in \mathcal{NP} , we show $3SAT \leq_m^p$ VC.
 For given formula $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$, we construct a pair $\langle G, k \rangle$ of a graph and an integer in polynomial time.

**There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k**

Construction of G (F has n variables and m clauses):
 1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
 2. For each clause $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
 3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
 4. let $k = n + 2m$

Fを1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ 7/13

G の構成(F は n 変数 m 項とする):

1. F の各変数 x_i に対し、頂点 x_i^+, x_i^- と、辺 (x_i^+, x_i^-) を加える
2. F の各項 $C_j=(l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ に対し、頂点 l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} と辺 $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$ を加える
3. 項 C_j のリテラル l_{j1} が x_i のときは辺 (l_{j1}, x_i^+) を、 $\neg x_i$ のときは辺 (l_{j1}, x_i^-) を加える。
4. $k = n+2m$

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k 7/13

Construction of G (F has n variables and m clauses):

1. add vertices x_i^+, x_i^- and the edge (x_i^+, x_i^-) for each variable x_i in F
2. For each clause $C_j=(l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ in F , add vertices l_{j1}, l_{j2}, l_{j3} and three edges $(l_{j1}, l_{j2}), (l_{j2}, l_{j3}), (l_{j3}, l_{j1})$
3. add the edge (l_{j1}, x_i^+) if the literal l_{j1} is x_i , or add (l_{j1}, x_i^-) if it is $\neg x_i$ for each clause C_j
4. let $k = n+2m$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

G の構成は、与えられた F から F のサイズに対する多項式時間で可能。したがって以下を示せばよい:

Fを1にする割当が存在する $\Leftrightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ 8/13

観察:

G の構成から任意の頂点被覆 S は $\begin{cases} x_i^+, x_i^- \text{ のどちらかを含む} \\ C_j \text{ の3頂点中、最低2つを含む} \end{cases}$ によって $|S| \geq n+2m = k$ である。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

It is easy to see that the construction of G from F can be done in polynomial time of the size of F . Hence, we show that...

**There is an assignment that makes $F()=1$
 $\Leftrightarrow G$ has a vertex cover of size k** 8/13

Observation:

From the construction of G , any vertex cover S should contain $\begin{cases} \text{at least one of } x_i^+ \text{ or } x_i^- \\ \text{at least 2 of 3 vertices in } C_j \end{cases}$

Hence we have $|S| \geq n+2m = k$.

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

Fを1にする割当が存在する $\Rightarrow G$ がサイズ k の頂点被覆を持つ 9/13

1. それぞれの変数 x_i が $\begin{cases} x_i=1 \text{ なら } x_i^+ \text{ を } S \text{ に入れる} \\ x_i=0 \text{ なら } x_i^- \text{ を } S \text{ に入れる} \end{cases}$
2. それぞれの項 $C_j=(l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ は充足されているので、最低1つのリテラル (l_{j1}) については変数との間の辺 (l_{j1}, x_{i1}) は x_{i1} によって被覆されている。したがって、それ以外の二つのリテラル (l_{j2}, l_{j3}) を S に入れる。

\Rightarrow **観察** より、 S はサイズ k の頂点被覆になる。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

**If there is an assignment that makes $F()=1$,
 G has a vertex cover of size k** 9/13

1. Put $\begin{cases} x_i^+ \text{ if } x_i=1 \\ x_i^- \text{ if } x_i=0 \end{cases}$ into S for each x_i .
2. Since each clause $C_j=(l_{j1}, l_{j2}, l_{j3})$ is satisfied, at least one literal, say l_{j1} , the edge (l_{j1}, x_{i1}) is covered by the variable x_{i1} . Therefore, put the remaining literals (l_{j2}, l_{j3}) into S .

\Rightarrow From the **Observation**, S is a vertex cover of size k .

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4+2 \times 3=10$

Gがサイズkの頂点被覆を持つ⇒ Fを1にする割当が存在する 10/13

- 観察より、被覆Sは項から $2m$ 個、変数から n 個の頂点を含む。
- さらに各変数 x_i については x_i^+ か x_i^- の一方しか、各項 C_j についてはちょうど2つの頂点しかSに含むことができない。
- よって各項 C_j はSに含まれないリテラル l_j を含むが、これに付随する辺は他方が被覆されていなければならない。
 $\Rightarrow \left[\begin{array}{l} x_i^+ \text{がSに含まれるなら } x_i=1 \\ x_i^- \text{がSに含まれるなら } x_i=0 \end{array} \right]$ という割当はFを充足する。

例: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

QED.

If G has a vertex cover of size k, there is an assignment s.t. F()=1 10/13

- From **Observation**, a cover S contains $2m$ vertices from the clauses, and n vertices from the variables.
- Thus the cover S contains exactly one of x_i^+ and x_i^- and exactly two literals of a clause C_j .
- Hence each clause C_j contains exactly one literal l_j which is not in S, and hence incident edge should be covered by a variable vertex.
 \Rightarrow The following assignment satisfies F: $\left[\begin{array}{l} x_i=1 \text{ if } x_i^+ \text{ in } S \\ x_i=0 \text{ if } x_i^- \text{ in } S \end{array} \right]$

Ex: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4)$

$k = 4 + 2 \times 3 = 10$

QED.

充足できない例: 11/13

$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$

$k = 3 + 2 \times 4 = 11$

充足できないFでは、どのリテラルも頂点でカバーされていない項が必ず存在する。この項のリテラルは3つとも Vertex Cover に入れざるを得ない。よって Vertex Cover のサイズは $k+1$ 以上になる。

Unsatisfiable example: 11/13

$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \neg x_2) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$

$k = 3 + 2 \times 4 = 11$

When F is unsatisfiable, it contains at least one clause such that each literal is not covered by a vertex. So, Vertex Cover should contain three literals in the clause. Hence any vertex cover has size at least $k+1$.

定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は NP 完全問題 12/13

[証明] (上記の問題をDHAM_{≤5}と略記する)

DHAM_{≤5} がNPに属するのは、DHAMがNPに属することから自明。したがって完全性を示せばよい。DHAM_{≤m}^P DHAM_{≤5}を示す。

アイデア:

次数14の頂点v(左)の(入ってくる辺集合と(出ていく辺集合)を右図の'gadget'で置き換える

左図でvを1度だけ通る閉路と右図でvを1度だけ通る閉路は対応する。

Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5 (abb. DHAM_{≤5}) is NP-complete 12/13

[Proof] Since DHAM ∈ NP, DHAM_{≤5} ∈ NP. We DHAM_{≤m}^P DHAM_{≤5}.

Idea:

Replace the set of "arcs to v" and the set of "arcs from v" by a right 'gadget'.

A Hamiltonian cycle through v on the original graph corresponds to the Hamiltonian cycle through v on the resultant graph.


定理: 次数高々5の有向グラフ上の DHAM は \mathcal{NP} 完全問題

13/13

アイデア:

ポイント:

- 各閉路は上から下
- 各頂点は次数 ≤ 5



[証明(概要)]

与えられたグラフ G の次数が6以上のそれぞれの頂点に入る辺と出る辺を上記の gadget で置き換える。

- 元のグラフ G が n 頂点 m 辺であったなら, gadget で置き換えたあとのグラフ G' は $O(n+m)$ 頂点 $O(m)$ 辺となる。したがって上記の還元は G の大きさの多項式時間で可能。
- また G' のすべての頂点は次数は **たかだか5** である。
- G がハミルトン閉路をもつ $\Leftrightarrow G'$ がハミルトン閉路を持つ QED.


Theorem: DHAM on a directed graph with max. degree=5 (abb. $\text{DHAM}_{\leq 5}$) is \mathcal{NP} -complete

13/13

Idea:

Points:

- Up to down via cycle
- Each vertex has $\text{deg} \leq 5$



[Proof (sketch)]

For each vertex v of degree ≥ 6 , replace the edges around v by the gadget.

- If the original graph G has n vertices with m edges, the resultant graph G' contains $O(n+m)$ vertices with $O(m)$ edges. Hence the reduction can be done in polynomial time of n & m .
- Each vertex in G' has degree **at most 5**.
- G has a Hamiltonian cycle $\Leftrightarrow G'$ has a Hamiltonian cycle. QED.

残りの予定(Schedule)

- 11/24 (Fri): 講義に関するアンケート実施(Anonymous Questionnaire)
 - Chapter 4 ~
 - 持ち込み不可(No text, No notes, ...)
- 11/29 (Wed):
 - 期末試験と6回目のレポートの回収(Final Exam. & 6th report submission.)
 - オフィスアワー(Office Hour): 6回目のレポートの解答と解説, 期末試験の解答と解説(Answers and comments for 6th report and final exam.)
- 12/1 (Fri): 休講(No class)
- 上記以降(After that...):
 - 成績などの問い合わせはメールで(Ask by e-mail if you have any questions about records, etc.)
 - レポート, 試験の返却希望者は適宜取りにくること(Come to my office to receive the reports and/or final exam, if you want.)